

LEXIKON

ELLENBOGEN/HAND

Orthopädische Praxis
Professor Dr. med. Markus Maier

Ferdinand-Maria Str. 6 | 82319 Starnberg
Fon: 08151 - 268 368 | Fax: 08151 - 268 962
info@doc-maier.com | www.doc-maier.com

Arthrolyse

Lösung von im Gelenk liegenden Verwachsungen durch eine Operation

Arthroplastik

Neubildung eines Gelenkes. Alloarthropastik: Implantation einer Endoprothese (Kunstgelenk); Resektionsarthroplastik: operative Entfernung eines knöchernen Gelenkpartners; Resektions-Interpositionsarthroplastik: nach Entfernung des krankhaft veränderten Gelenkpartners wird körpereigenes Weichteilgewebe in den neu geschaffenen Spalt eingelegt.

Bennet-Fraktur

Bruch im Bereich des 1. Mittelhandknochens

Bicepssehnenruptur

Meist Riss der langen Bicepssehne am Schultergelenk. Nur seltenen operative Rekonstruktion notwendig, da die lange Bicepssehne zur Kraftentwicklung des Armes nur wenig beiträgt

Bouchardarthrose

Gelenkverschleiß der Fingermittelgelenke

Rhizarthrose

Gelenkverschleiß des Gelenkes zwischen Handwurzel und 1. Mittelhandknochen

LEXIKON

ELLENBOGEN/HAND

Epicondylitis radialis

Tennisellenbogen.

Schmerz am Ursprung der Strecksehnen am seitlichen Oberarm

Epicondylitis ulnaris

Golferellenbogen, Werferellenbogen.

Schmerz am Ursprung der Hand- und Fingerbeugemuskulatur am medialen Oberarmepicondylus.

Ergotherapie

Maßnahme der Rehabilitation zur Verbesserung von Kraft, Feinmotorik und Handgeschicklichkeit

Fallhand

Lähmung der Handstreckmuskulatur bei Schaden des Nervus radialis

Hammerfinger

Unfähigkeit, das Fingerendglied zu strecken.

Ursache ist die Ruptur der Fingerstrecksehne

Handgelenkganglion

Flüssigkeitsgefüllte Aussackung der Gelenkkapsel

Heberdenarthrose

Gelenkverschleiß der Fingerendgelenke

LEXIKON

ELLENBOGEN/HAND

Carpaltunnel

Knöchern-bindegewebiger Kanal der handtellerseitigen Handwurzelknochen.
Verbindung des Unterarms mit der Hohlhand

Carpaltunnelsyndrom

Im Carpaltunnel verläuft der Nervus medianus.
Ist dieser Nerv im Kanal eingeengt, kommt es zu Gefühlsstörungen vom Daumen bis zum Mittelfinger

Hypothenar

Kleinfingerballen

Knopflochdeformität

Fixierte Fehlstellung eines Fingers im Mittel- und Endgelenk.
Häufiges Vorkommen bei rheumatischen Erkrankungen

Krallenhand

Lähmung nach Schädigung des Nervus ulnaris.
Die Grundgelenke der Finger sind überstreckt, die Mittel- und Endgelenke gebeugt

Lengemannnaht

Spezielle Nahttechnik zur Versorgung von Strecksehnenverletzungen

LEXIKON

ELLENBOGEN/HAND

Morbus Dupuytren

Bindegewebeerkrankung der Handinnenfläche und der Finger. Charakteristisch ist die Verdickung und Schrumpfung des Weichgewebes der Handinnenfläche. Folge ist die fixierte Beugstellung der betroffenen Fingergelenke

Panaritium

Eitrige Entzündung am Finger, die üblicherweise operativ versorgt wird

Schnellender Finger

Einengung von Sehne und Sehnenscheide zwischen Ringband und Mittelhandknochen. Meist Daumen betroffen

Schwanenhalsdeformität

Fixierte Fingerdeformität, häufig bei Rheumatikern. Das körpernahe (proximale) Fingergelenk ist überstreckt, das körperferne (distale) Fingergelenk fixiert gebeugt

Sesambein

Knöchernen Stabilisierungshilfen einer Sehne, die in deren Verlauf eingelagert sind

Scaphoidfraktur

Kahnbeinbruch. Häufigster Knochenbruch im Bereich der Handwurzel. Meist operative Therapie notwendig.

LEXIKON

ELLENBOGEN/HAND

Skidaumen

Abriss des außen gelegenen Seitenbandes am Daumen.

Sudecksyndrom

Algodystrophie, sympathische Reflexdystrophie, Ernährungsstörung von Arm oder Bein auf Basis einer Fehlregulation von Nervensystem oder der Blutgefäße

Tendovaginitis

Sehnenscheidenentzündung.

Hör- und tastbares Reiben einer Sehne, oft nach Verletzung

Tendovaginitis stenosans de Quervain

Sehnenscheidenentzündung der Daumensehnen.

Thenar

Daumenballen